

Regelinduktion

Regelinstanzenmenge R $I_R = \{x \mid \Vdash_R x\}$

Satz I_R ist R -abgeschlossen; und ist Q eine R -abgeschlossene Menge, dann ist $I_R \subseteq Q$.

Satz Sei P eine Eigenschaft über I_R . Dann gilt $\forall x \in I_R. P(x)$ genau dann, wenn für alle Regelinstanzen $(X/y) \in R$ mit $X \subseteq I_R$ gilt: $(\forall x \in X. P(x)) \Rightarrow P(y)$.

Satz Sei Q eine Eigenschaft über $A \subseteq I_R$. Dann gilt $\forall a \in A. Q(a)$ genau dann, wenn für alle Regelinstanzen $(X/y) \in R$ mit $X \subseteq I_R$ und $y \in A$ gilt: $(\forall x \in X \cap A. Q(x)) \Rightarrow Q(y)$.

IMP: Regelinduktion für Anweisungen

Für eine Eigenschaft P über $\text{Stm} \times \Sigma \times \Sigma$ gilt

$\forall S \in \text{Stm}, \sigma, \sigma' \in \Sigma. \langle S, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \Rightarrow P(S, \sigma, \sigma')$ genau dann, wenn

$$\forall \sigma \in \Sigma. P(\text{skip}, \sigma, \sigma)$$

$$\wedge \forall x \in \text{Var}, a \in \text{AExp}, \sigma \in \Sigma. P(x := a, \sigma, \sigma[x \mapsto \mathcal{A}[[a]] \sigma])$$

$$\wedge \forall S_1, S_2 \in \text{Stm}, \sigma, \sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma.$$

$$\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma_1 \wedge P(S_1, \sigma, \sigma_1) \wedge \langle S_2, \sigma_1 \rangle \rightarrow \sigma_2 \wedge P(S_2, \sigma_1, \sigma_2) \Rightarrow P(S_1 ; S_2, \sigma, \sigma_2)$$

$$\wedge \forall b \in \text{BExp}, S_1, S_2 \in \text{Stm}, \sigma, \sigma_1 \in \Sigma.$$

$$\mathcal{B}[[b]] \sigma = tt \wedge \langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma_1 \wedge P(S_1, \sigma, \sigma_1) \Rightarrow P(\text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2, \sigma, \sigma_1)$$

$$\wedge \forall b \in \text{BExp}, S_1, S_2 \in \text{Stm}, \sigma, \sigma_2 \in \Sigma.$$

$$\mathcal{B}[[b]] \sigma = ff \wedge \langle S_2, \sigma \rangle \rightarrow \sigma_2 \wedge P(S_2, \sigma, \sigma_2) \Rightarrow P(\text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2, \sigma, \sigma_2)$$

$$\wedge \forall b \in \text{BExp}, S \in \text{Stm}, \sigma \in \Sigma. \mathcal{B}[[b]] \sigma = ff \Rightarrow P(\text{while } b \text{ do } S, \sigma, \sigma)$$

$$\wedge \forall b \in \text{BExp}, S \in \text{Stm}, \sigma, \sigma', \sigma'' \in \Sigma.$$

$$\mathcal{B}[[b]] \sigma = tt \wedge \langle S, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \wedge P(S, \sigma, \sigma') \wedge$$

$$\langle \text{while } b \text{ do } S, \sigma' \rangle \rightarrow \sigma'' \wedge P(\text{while } b \text{ do } S, \sigma', \sigma'') \Rightarrow$$

$$P(\text{while } b \text{ do } S, \sigma, \sigma'')$$

IMP: Freie änderbare Variablen

$\text{fvar}_L : \text{Stm} \rightarrow \wp \text{Var}$

$$\text{fvar}_L(\text{skip}) = \emptyset$$

$$\text{fvar}_L(x := a) = \{x\}$$

$$\text{fvar}_L(S_1 ; S_2) = \text{fvar}_L(S_1) \cup \text{fvar}_L(S_2)$$

$$\text{fvar}_L(\text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2) = \text{fvar}_L(S_1) \cup \text{fvar}_L(S_2)$$

$$\text{fvar}_L(\text{while } b \text{ do } S) = \text{fvar}_L(S)$$

IMP: Strukturell-operationale Semantik

Konfigurationen $\langle S, \sigma \rangle \in \text{Stm} \times \Sigma, \quad \sigma \in \Sigma$

Terminale Konfigurationen $\sigma \in \Sigma$

Transitionen $\langle S, \sigma \rangle \Rightarrow \langle S', \sigma' \rangle, \quad \langle S, \sigma \rangle \Rightarrow \sigma'$

(skip_{sos}) $\langle \text{skip}, \sigma \rangle \Rightarrow \sigma$

(assign_{sos}) $\langle x := a, \sigma \rangle \Rightarrow \sigma[x \mapsto \mathcal{A}[[a]] \sigma]$

(seq_{sos}¹)
$$\frac{\langle S_1, \sigma \rangle \Rightarrow \langle S'_1, \sigma' \rangle}{\langle S_1 ; S_2, \sigma \rangle \Rightarrow \langle S'_1 ; S_2, \sigma' \rangle}$$

(seq_{sos}²)
$$\frac{\langle S_1, \sigma \rangle \Rightarrow \sigma'}{\langle S_1 ; S_2, \sigma \rangle \Rightarrow \langle S_2, \sigma' \rangle}$$

IMP: Strukturell-operationale Semantik

($\text{if}_{\text{SOS}}^{\text{tt}}$) $\langle \text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2, \sigma \rangle \Rightarrow \langle S_1, \sigma \rangle, \quad \text{falls } \mathcal{B}[[b]] \sigma = \text{tt}$

($\text{if}_{\text{SOS}}^{\text{ff}}$) $\langle \text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2, \sigma \rangle \Rightarrow \langle S_2, \sigma \rangle, \quad \text{falls } \mathcal{B}[[b]] \sigma = \text{ff}$

($\text{while}_{\text{SOS}}^{\text{tt}}$) $\langle \text{while } b \text{ do } S, \sigma \rangle \Rightarrow \langle S ; \text{while } b \text{ do } S, \sigma \rangle, \quad \text{falls } \mathcal{B}[[b]] \sigma = \text{tt}$

($\text{while}_{\text{SOS}}^{\text{ff}}$) $\langle \text{while } b \text{ do } S, \sigma \rangle \Rightarrow \sigma, \quad \text{falls } \mathcal{B}[[b]] \sigma = \text{ff}$

IMP: Ableitungen in der strukturell-operationalen Semantik

Endliche Ableitung $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_k \quad \gamma_0 \Rightarrow^* \gamma_k$

- ▶ $\gamma_i \Rightarrow \gamma_{i+1}$ für $0 \leq i < k$ und γ_k terminal oder festgefahren

Unendliche Ableitung $\gamma_0, \gamma_1, \dots \quad \gamma_0 \uparrow$

- ▶ $\gamma_i \Rightarrow \gamma_{i+1}$ für $i \geq 0$

Semantische Äquivalenz für Anweisungen $S, S' \in \text{Stm}$

- ▶ $\langle S, \sigma \rangle \Rightarrow^* \gamma \Leftrightarrow \langle S', \sigma \rangle \Rightarrow^* \gamma$ für alle $\sigma \in \Sigma$ und terminale oder festgefahrne γ ;
- ▶ $\langle S, \sigma \rangle \uparrow \Leftrightarrow \langle S', \sigma \rangle \uparrow$ für alle $\sigma \in \Sigma$

IMP: Äquivalenz von natürlicher und strukturell-operationaler Semantik

Satz Seien $S \in \text{Stm}$ und $\sigma, \sigma' \in \Sigma$. Dann gilt

$$\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \iff \langle S, \sigma \rangle \Rightarrow^* \sigma' .$$